

Epidemiology of Death Caused by Drug Abuse in Golestan Province during 2010-2015

Shokrzadeh M¹, Zarei H², Badeli A³, Jalilian J⁴, Ebrahimi Falahtalab F⁵, Lashkarboloki G⁶, Esmaily M⁷, Shayeste Y*⁸

1. Professor, Pharmaceutical Sciences Research Center, Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
 2. General Physician, Golestan Department of Forensic Medicine, Gorgan, Iran
 3. BS in Applied Mathematics, Golestan Department of Forensic Medicine, Gorgan, Iran
 4. MSc in Toxicology, Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
 5. Forensic Medicine and Toxicology Specialist, Golestan Department of Forensic Medicine, Gorgan, Iran
 6. PhD student in Food Science and Technology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
 7. BS Student in Engineering of Environmental Health. Faculty of Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
 8. MSc in Toxicology, Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
- *Corresponding author. Tel: +989113738979, Fax: +981732160330, E-mail: shayeste.yaghoub@gmail.com

Received: Feb 14, 2017 Accepted: Jul 28, 2018

ABSTRACT

Background & objectives: Drug abuse is one of the most psychosocial and public health challenges in the world that is increasing every day and lead to disability and death. The aim of this study was to investigate the epidemiology of death due to drug abuse in Golestan province.

Methods: This cross-sectional study was carried out on all referential bodies to Golestan department of forensic medicine that were died due to drug abuse from March 2010 to March 2016. Data were collected from medical records and analyzed using SPSS version 16 and Pearson chi-square test.

Results: Of the 170 people, who had drug abuse, 95.9% were male and 32.4% were 30-39 years old. The majority of cases (81.8%) were urban residents. Most of them were married (53.5%) and 38.2% of them had secondary education. Drug abuse was identified as the main cause of death (40%). In 56.5% of cases, injection was the most important way of drug abuse.

Conclusion: Opium was the most common agents of death due to drug abuse in Golestan province that were observed mostly among married men aged 30-39 years.

Keywords: Epidemiology; Opioid Abuse; Death; Forensic Medicine

اپیدمیولوژی فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان گلستان در سال‌های ۱۳۸۹-۹۴

محمد شکرزاده^۱، حسین زارعی^۲، ابوالقاسم بادلی^۳، جعفر جلیلیان^۴، فرامرز ابراهیمی فلاح طلب^۵
علامعلی لشکربلوکی^۶، مطهره اسماعیلی^۷، یعقوب شایسته^{۱*}

۱. استاد، مرکز تحقیقات علوم دارویی، گروه سم شناسی و فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 ۲. پزشک عمومی، اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان، گرگان، ایران
 ۳. کارشناس ریاضی کاربردی، اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان، گرگان، ایران
 ۴. کارشناس ارشد سم شناسی، گروه سم شناسی و داروشناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
 ۵. متخصص پزشکی قانونی و سم شناسی بالینی، اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان، گرگان، ایران
 ۶. دانشجوی دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
 ۷. دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 ۸. کارشناس ارشد سم شناسی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
- * نویسنده مسئول. تلفن: ۰۱۱۳۷۳۸۹۷۹ - ۰۱۷۳۲۱۶۰۳۳۰. فکس: ۰۱۷۳۲۱۶۰۳۳۰. ایمیل: shayeste.yaghoub@gmail.com

چکیده

زمینه و هدف: سوء مصرف مواد مخدر از مهمترین چالش‌های روانی - اجتماعی و سلامت عمومی در جهان است که هر روز در حال افزایش بوده و باعث ایجاد ناتوانی و مرگ و میر فراوانی می‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیکی مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان گلستان بود.

روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی و بر روی تمامی اجسام ارجاعی به اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان که در فاصله ابتدای سال ۱۳۸۹ لغایت پایان سال ۱۳۹۴ به دلیل سوء مصرف مواد مخدر فوت نموده بودند، انجام گرفت. اطلاعات مربوطه از پرونده‌های پزشکی افراد جمع آوری و با کمک نرم افزار SPSS-16 و آزمون پیرسون مرتب کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در بین ۱۷۰ مورد تشخیصی سوء مصرف مواد مخدر، ۹۵/۹ درصد مرد و ۴/۳۲ درصد آن‌ها سن بین ۳۹ تا ۴۹ سال داشتند. اکثریت موارد (۸۱/۸٪) ساکن شهر بودند. غالباً این افراد متاهل (۵۳/۵٪) و ۳۸/۲ درصد آنها دارای تحصیلات در سطح راهنمایی بودند. سوء مصرف تریاک به عنوان عامل اصلی مرگ (۴٪) شناسایی گردید. در ۵/۵۶ درصد موارد تزریق مهمنمایی بودند. سوء مصرف تریاک به عنوان عامل اصلی مرگ (۴٪) شناسایی گردید. در ۵/۵۶ درصد موارد تزریق مهمنمایی بودند. سوء مصرف تریاک به عنوان عامل اصلی مرگ (۴٪) شناسایی گردید.

نتیجه گیری: تریاک مهمنمایی عامل مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان گلستان بود که بیشتر در بین مردان متاهل سنین ۳۹-۳۰ سال مشاهده گردید.

واژه‌های کلیدی: اپیدمیولوژی، سوء مصرف مواد مخدر، مرگ، پزشکی قانونی

دریافت: ۹۵/۱۱/۲۶ پذیرش: ۹۷/۵/۶

(۱،۲). سوء مصرف این مواد منجر به ایجاد مشکلات

عمده پزشکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوامع شده که بار ناشی از آن در همه کشورها به خصوص

مقدمه

مساله مواد مخدر به عنوان مهمترین و دردناکترین معضل اجتماعی در عصر حاضر به حساب می‌آید

همچنین گزارش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور نیز حاکی از آن است که عوارض ناشی از اعتیاد دومین عامل فوت در مرگ‌های مشکوک در کشور می‌باشد^(۳). لذا با توجه به شیوع بالای مصرف مواد مخدر، حجم بالای عبور و توزیع آن در کشور و همچنین با توجه به میزان قابل توجه مرگ ناشی از آن و فقدان آمار دقیق در این حوزه، این بررسی با هدف بررسی اپیدمیولوژیکی مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در طی سال‌های ۱۳۸۹-۹۴ در استان گلستان انجام گرفت.

روش کار

بررسی حاضر به صورت مقطعی و به شکل توصیفی-تحلیلی از طریق جمع‌آوری اطلاعات از پرونده تمامی موارد فوتی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و سایر روان‌گردان‌ها که در فاصله سال‌های ۱۳۸۹-۹۴ به اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان ارجاع شده بودند به تعداد ۴۲۰ نفر و به صورت سرشماری انجام گرفت. تمامی این افراد متوفی، ساکن استان گلستان بوده و معیار ورود این افراد به مطالعه داشتن پرونده فوت ناشی از سوء مصرف مواد در اداره کل پزشکی قانونی استان در محدوده زمانی تعیین شده و همچنین معیار خروج آن‌ها کامل نبودن پرونده پزشکی تحت بررسی بود. تایید تشخیص مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر و سایر روان‌گردان‌ها با نمونه‌گیری از بافت‌های مختلف جسد از قبیل خون، صفراء، معده، ادرار، امعا و احشا و با کمک روش‌های مختلف تاییدی از قبیل اسپکتروفوتومتری، تست رنگی، TLC^۱, HPLC^۲, GC^۳ و GC MASS^۴ انجام گرفت. جمع‌آوری اطلاعات از پرونده افراد جامعه آماری مورد نظر به کمک چک لیستی مشتمل بر ۱۵ سوال شامل ۶ سوال مربوط به مشخصات جمعیت شناختی

² Thin Layer Chromatography

³ High Performance Liquid Chromatography

⁴ Gas Chromatography

⁵ Gas Chromatography-Mass Spectrometry

کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده و از جمله علل مرگ زودرس قلمداد می‌گردد. گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد^۱ حاکی از آن بوده که شمار مصرف کنندگان انواع مواد مخدر در جهان در سال ۲۰۰۴ رقمی در حدود ۱۸۵ میلیون نفر برآورد گردیده که ۳ درصد جمعیت جهان را شامل می‌گردد^(۳). از طرفی آمار دقیق در خصوص تعداد معتادان به مواد مخدر در سطح کشور وجود ندارد ولی با توجه به دلایل متعدد فرهنگی، داشتن جمعیت جوان، موقعیت جغرافیایی و همچوواری با دو کشور بزرگ تولیدکننده مواد مخدر، افغانستان و پاکستان، ایران در این خصوص دارای شرایط بحرانی و حاد بوده و طبق اظهارات مقامات رسمی کشور، تعداد معتادان بیش از ۲ میلیون نفر برآورد گردیده که این تعداد روز به روز در حال افزایش می‌باشد^(۴). این اینوئیدها شایع‌ترین نوع واپستگی به مواد در کشور بوده که رایج‌ترین آنها تریاک، شیره و هروئین است که با استفاده از روش‌های خوراکی، تزریقی و یا استنشاقی مورد سوء مصرف قرار می‌گیرند^(۳). از طرفی مصرف بیش از حد مواد مخدر در جهان باعث افزایش بار مرگ و میر گردیده است^(۵). مرگ ناشی از مصرف مواد مخدر در جامعه امروزی به علل گوناگون رخ می‌دهد که در این خصوص می‌توان به مصرف مواد مخدر ناخالص و نیز استفاده از راه‌های غیرمعمول مانند تزریق و ریدی تریاک و یا پودر استنشاقی هروئین اشاره نمود^(۶). سوء مصرف مواد مخدر عامل اصلی ۹۹ تا ۲۵۳ هزار مورد از مرگ‌ها در سراسر جهان در سال ۲۰۱۰ بوده و همچنین بر اساس گزارشات سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۳، سالانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر به دلیل مواد مخدر دچار مرگ می‌گردند. از طرفی طبق بررسی‌ها، مرگ‌های مرتبط با مواد مخدر ۰/۵ تا ۱/۳ درصد تمام مرگ‌ها را در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال شامل می‌گردد^(۷).

¹ United Nations Office On Drugs and Crime

شده مربوط به طبقه سنی ۳۰-۳۹ سال (۵۵ نفر، ۴/۳۲٪) بود (۱/۰۰<*p*). همچنین بر اساس نتایج این آزمون، مشخص گردید غالب افراد تحت بررسی به طور معناداری متاهل (۹۱ نفر، ۵/۵۳٪) (۱/۰۰<*p*) و شاغل (۱۰۴ نفر، ۶/۶۱٪) (۱/۰۰<*p*) بوده و بیش از نیمی از افراد شاغل (۶۲ نفر، ۶/۵۹٪) دارای شغل آزاد بودند. از طرفی اغلب نمونه های تحت بررسی به طور معناداری ساکن شهر بوده (۹۱ نفر، ۸/۱٪) (۱/۰۰<*p*) و در زمینه تحصیلات نیز غالباً دارای تحصیلات راهنمایی (۶۵ نفر، ۲/۳۸٪) بودند (۱/۰۰<*p*). مشخصات جمعیت شناختی افراد تحت بررسی به طور کامل در جدول ۱ بیان گردیده است. مطالعه به طور توزیع زمانی به طور برابر در فصول بهار و تابستان ۵۰ مورد فوت ناشی از مصرف مواد مخدر رخ داده (جمعاً ۱۰۰ مورد، ۸/۵۸٪) و مابقی موارد در فصول زمستان (۴۱ نفر، ۱/۲۴٪) و پاییز (۲۹ نفر، ۱/۱۷٪) اتفاق افتاده بود که در این خصوص بین فراوانی مرگ ناشی از سوء مصرف مواد و فصل ارتباط معنادار آماری مشاهده نگردید (۰/۰۷۲).*(p=*

در این بررسی از کل موارد فوت ناشی از مصرف مواد مخدر به طور معناداری (۷۲ مورد، ۴۲٪) در منزل رخ داده بود (۱۰۰٪). راه تزریق با فراوانی ۹۶ نفر (۵۶٪) به طور غالب مهمترین روش مصرف مواد بوده است (۱۰۰٪). همچنین در ۲۷ مورد روش مصرف استنشاق (۹٪)، ۱۹ مورد خوراکی (دهانی) (۲٪) و در ۲۸ مورد نیز

بیشترین ماده مخدر یافت شده از جسد تریاک بود (۶۸ نفر، ۴۰٪) و مورفین (۶۰ نفر، ۳۵٪) و متادون (۲۶ نفر، ۱۵٪) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. از نظر نوع ماده مخدر یافت شده در جسد بر حسب جنس در تمامی موارد مردان بر زنان غالب بودند. فروانی انواع مواد مخدر یافت شده در اجساد مورد بررسی بر حسب جنس در نمودار ۱ نمایش داده شده است.


(سن، جنس، وضعیت تاہل، تحصیلات، شغل و محل سکونت)، ۷ سوال مربوط به مشخصات زمینه‌ای و شرایط ایجاد مسمومیت (تاریخ، فصل و سال فوت، روش مصرف، محل مسمومیت، محل فوت و عامل مسمومیت) و ۲ سوال مربوط به یافته‌های آزمایشگاهی و تشخیصی (روش بررسی و نوع ماده تشخیصی) انجام گرفت، سپس اطلاعات تکمیل شده در SPSS-16 و با استفاده از روش‌های توصیفی (میانه، میانگین، نسبت، انحراف معیار، دامنه، جداول تقاطعی و غیره) و تحلیلی (آزمون ناپارامتریک کای اسکوئر) مورد پردازش قرار گرفت. سطح معنی‌داری تمام آزمون‌های آماری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد. در این مطالعه مجوزهای لازم و تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ابتدای کار اخذ گردیده و محرمانه بودن نام و مشخصات هویتی افراد لحاظ گردید.

یافته‌ها

در فاصله سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۴ تعداد ۴۲۰ مورد مرگ ناشی از مسمومیت در اداره کل پزشکی قانونی استان گلستان ثبت گردیده که از این تعداد ۱۷۰ مورد به دلیل سوء مصرف مواد مخدر بوده است. بر این اساس مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر ۵/۴۰ درصد کل مرگ‌های ناشی از مسمومیت را در بر داشته است. در این بررسی مشخص گردید که به طور معناداری (۱۶۳ نفر از کل موارد فوت ناشی از مصرف مواد مخدر مرد ۹۵/۹٪) و مابقی زن بودند (۷ نفر، ۱/۴٪). میانگین سنی زنان ۵/۱۲±۴/۰ سال، مردان ۲۱/۱۲±۳/۵ سال و میانگین سنی کل ۱۹/۱۲±۸/۲ سال بود. کمترین سن فرد مورد بررسی ۱۶ و بیشترین ۸۰ سال بود. نتایج آزمون مربع کای نشان داد که بین فراوانی فوت ناشی از سوء مصرف مواد با متغیر سن ارتباط معنادار آماری وجود دارد به طوری که بیشتر موارد فوت

جدول ۱. مشخصات جمعیت شناختی افراد تحت بررسی

متغیر	مرد	زن	جنس
سطح معناداری (آزمون کای اسکوئر)	۹۵/۹	۱۶۳	
<i>p</i> <0.001	۴/۱	۷	
	۳/۵	۶	کم تراز
	۳۱/۲	۵۳	۲۰-۲۹
	۳۲/۴	۵۵	۳۰-۳۹
	۱۴/۱	۲۴	۴۰-۴۹
	۱۸/۸	۳۲	۵۰ و بیشتر
	۳۵/۳	۶۰	مجرد
<i>p</i> <0.001	۵۳/۵	۹۱	متاهل
	۸/۲	۱۴	مطلقه
	۲/۹	۵	همسر فوت شده
	۳۷/۱	۶۳	بی کار
<i>p</i> <0.001	۶۱/۲	۱۰۴	شاغل
	۱/۸	۳	خانه دار
	۱۲/۹	۲۲	بی سواد
	۳۰/۶	۵۲	ابتدایی
<i>p</i> <0.001	۳۸/۲	۶۵	راهنمایی
	۱۷/۶	۳۰	دیبرستان
	۰/۶	۱	دانشگاهی
<i>p</i> <0.001	۸۱/۸	۱۳۹	شهر
	۱۸/۲	۳۱	روستا
وضعیت تحصیلی			
وضعیت اشتغال			
محل سکونت			



از نظر تحصیلات اکثریت افراد دارای سطح تحصیلات پایینی بودند که این مورد در بررسی‌های مشابه صورت گرفته در سازمان پژوهشی قانونی (۱۵) نیز مشاهده گردیده و نشان دهنده آن است که با افزایش سطح تحصیلات موارد فوت ناشی از مصرف مواد مخدر کاهش می‌یابد که این امر اهمیت آموزش و اطلاع رسانی در خصوص عوارض مواد

مخدر در جامعه را بیشتر نمایان می‌سازد. در بررسی حاضر بیشتر موارد فوت در افراد شاغل مشاهده گردید و نیمی از این افراد نیز دارای شغل آزاد بودند که این مورد همسو با بررسی‌های صورت گرفته در مازندران بوده و شاید بتوان نداشتن شغل ثابت و یا درآمد کافی در مشاغل آزاد را در گرایش این افراد به مواد مخدر مؤثر دانست. لذا تامین شغل و درآمد کافی به خصوص در اقسام جوان می‌تواند در کاهش ابتلاء و مرگ ناشی از سوء مصرف مواد در جامعه نقش داشته باشد (۳).

از نظر نوع ماده مخدر یافت شده در جسد، در این بررسی ترباک بیشترین فراوانی را دارا بود. در مطالعات مشابه صورت گرفته در مازندران (۳)، کرمانشاه (۴)، خراسان شمالی (۵) نیز این موضوع ملاحظه می‌گردد. از طرفی تفاوت الگوی مواد مصرفی در برخی مطالعات از جمله در یک بررسی در آمریکا (۱۵) که متادون را به عنوان بیشترین ماده مخدر مصرفی معرفی کرده بود مشاهده می‌گردد ولی طبق بررسی‌ها در بین مواد مصرفی، اپیوئیدها شایع‌ترین علت مسمومیت منجر به فوت در کشور به حساب می‌آیند (۱۶). در همین خصوص عواملی از قبیل سطح دسترسی به مواد، عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و غیره را می‌توان در این اختلاف‌ها دخیل دانست (۱۷).

همسو با بسیاری از مطالعات مشابه (۳-۵)، روش تزریق شایع‌ترین راه مصرف مواد مخدر بود. همچنین نتایج مطالعات مشابه گویای آن است که میزان سوء مصرف تزریقی مواد در کشور بیش از

در ۱۰۰ مورد (۸/۵۸٪) از اجساد مورد بررسی، مرگ در محل حادثه رخ داده بود ($p < 0.001$). تعداد ۶۵ مورد (۲/۳۸٪) در مراکز درمانی و ۵ مورد (٪۰۲/۹) در حین انتقال به مراکز درمانی فوت شده بودند.

بحث

در مطالعه حاضر که به منظور بررسی اپیدمیولوژیکی موارد فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در استان گلستان صورت گرفت، مشخص گردید که مردان غالب جمعیت جامعه آماری را دارا می‌باشند. این نتایج هم سو با بسیاری از تحقیقات صورت گرفته از جمله در مازندران (۳)، خراسان شمالی (۵)، استرالیا (۸) و آمریکا (۹) بوده و عواملی از قبیل آزادتر بودن مردان در روابط اجتماعی و کنترل کمتر خانواده‌ها و نیز دسترسی بیشتر مردان به مواد مخدر در این روند نقش دارند (۳). همچنین همگام با برخی بررسی‌های مشابه انجام شده از جمله در مازندران، متأهله‌لین نسبت به مجردان جمعیت غالب را دارا بودند. در نقطه مقابل در برخی مطالعات صورت گرفته در گیلان (۱۰) و اصفهان (۱۱) مجردان از جمعیت بیشتری نسبت به متأله‌لین برخوردار بودند. احتمالاً عواملی از قبیل مشابه نبودن ترکیب هرم سنی و نیز تفاوت در نوع ماده مخدر مصرفی در جوامع مختلف را می‌توان در این اختلاف مؤثر دانست.

در بررسی حاضر گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند که این نتایج همسو با بررسی‌های صورت گرفته در کرمانشاه (۴) و آمریکا (۱۲) بوده و نسبت به مطالعات مشابه قبلی (۱۳، ۱۴) که سنین ۲۱ تا ۳۰ سال را به عنوان سنین شایع اعلام نموده بودند افزایش نشان می‌دهد. این نتایج نشان می‌دهد که در استان گلستان مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر بیشتر نیروهای فعال و خلاق جامعه را در بر گرفته و به طور نامحسوسی می‌تواند افراد مؤثر در سازندگی فردای جامعه را از دور خارج سازد.

که بیشتر در مردان میانسال و جوان ساکن شهر که دارای مشاغل آزاد بودند مشاهده گردید. همچنین سطح تحصیلات پایین و سوء مصرف مواد به صورت تزریقی نیز به طور معنا داری در این روند مؤثر بود. افزایش آگاهی عموم افراد جامعه و محدودیت دسترسی آسان به مواد در جهت جلوگیری از کاهش موارد ابتلا و مرگ و میر توصیه می‌گردد.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر تحت حمایت و حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی گلستان با کد ۹۳۱۱۲۱۲۵۳ می‌باشد. نویسندهای مقاله مراتب سپاس خود را از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان و نیز پرسنل سازمان پزشکی قانونی استان گلستان اعلام می‌دارند.

سوء مصرف غیرتزریقی آن‌ها است (۱۶) و از علل شایع استفاده بیشتر از این روش می‌توان به ایجاد اثرات فوری و سریع آن و نیز هزینه کمتر این روش نسبت به سایر روش‌ها را ذکر نمود (۱۸). از طرفی با توجه به احتمال انتقال برخی بیماری‌ها مانند ایدز در روش تزریقی، آموخته افراد در معرض خطر با تأکید بر مخاطرات مربوطه ضروری به نظر می‌رسد.

از محدودیت‌های این مطالعه می‌توان به احتمال ایجاد تورش در نحوه جمع‌آوری اطلاعات، عدم دسترسی به تمامی افراد جامعه آماری به دلیل عدم ارجاع به پزشکی قانونی و کم بودن حجم نمونه مورد بررسی اشاره نمود.

نتیجه گیری

فوت ناشی از سوء مصرف مواد مخدراز مهمترین علل مرگ ناشی از مسمومیت در استان گلستان بود

References

- Asghari E, Ebrahimi H, Chehreh Barghi V, Molaei F. Comparing the Related Sociodemographical Factors in the First and Recurrent Quitting of Drug Addiction. J health and care.2012; 14(1& 2):23-29.
- Chyryly S. Drug addiction family relationships in the mirror, Pyr morady Saeed translation, Tehran: Publication Hammam. 2008:15
- Shokrzadeh M, Yazdani-Charati J, Pourhossein M, Amadehjuybary N. Epidemiological Study of Mortality Rate from opioid Abuse in Referential Bodies to Mazandaran Department of Forensic Medicine. J Mazandaran Univ Med Sci. 2014; 24(115): 122-127.
- Salari A, Alikhani M, Alikhani AR, Zaki A, Jamshidi T, Farnia V. Registered Mortality in Kermanshah Legal Medicine Center Due to Taking Drug Abuse and Survey Demographics Variables and Doing Autopsy on their Body's. Ir J Forensic Med. 2016; 21(4): 255-262
- Hojjat SK, Golmakanie E, kazemi S, Norozi khalili M, lashkardoost H , Sedghi A, Ahmadi moghaddam S, Yousefkhani F. The incidence of death due to substance abuse documented in North Khorasan forensic Medicine Organization in years 2008-2013. J North Khorasan Univ Med Sci. 2013;5(3):571
- Jbal Ameli M, Ezadi N. The frequency of patients with drug-based indicators of demographic and clinical characteristics. Journal of Brings knowledge. 2005; 10(1): 71-80.
- United Nations Office on Drugs and Crime. Opioid overdose: preventing and reducing opioid overdose mortality. Vienna: united Nations office on drugs and crime. 2013:1-2.
- Hall W, Darke S. Trends in opiate overdose deaths in Australia 1979-1995. Drug Alcohol Depend. 1998; 52(1): 71-77.
- Wunsch MJ, Nakamoto K, Behonick G, Massello W. Opioid deaths in rural Virginia: a description of the high prevalence of accidental fatalities involving prescribed medications. Am J Addict. 2009; 18(1): 5-14.

- 10- Zarrabi H, Najafi K, Kafi M, Shirazi M. Substance Use among Students of Guilan University of Medical Sciences in Iran in 2005-2006. *Acta Medica Iranica*. 2009; 47(6): 473-478.
- 11- Izadi-Mood N, Tavahen N, Masoumi GR, Gheshlaghi F, Dana Siadat Z, Setareh M, et al. Demographic factors, duration of hospitalization, costs of hospitalization, and cause of death in patients intoxicated with amphetamines and opioids. *J Isfahan Med School*. 2011; 29(146): 890-900.
- 12- Bohnert AS, Fudalej S, Ilgen MA, Increasing poisoning mortality rates in the United States, 1999-2006, *Public Health Rep*. 2010; 125(4): 542-7.
- 13- KHalkhali MR, Najafi K, Nazifi F. The frequency of drugs and substances use in opiate dependents. *Med J Gilan Univ Med Sci*. 2006, 15(57): 40-47
- 14- Amooei M, Taremiān F. 109 death due to opium Consumption who refered to Iranian forensic centers. *Legal Med J*. 2002; 8:20-26.
- 15- Traci CG, Lauretta E, Graub H, Wayne C, Kinzly M, Heimer R. Epidemiologic trends and geographic patterns of fatal opioid intoxications in Connecticut, USA: 1997–2007. *Drug and Alcohol Dependence*. 2011;115: 221–228.
- 16- Gheshlaghi F, Eizadi-Moud N, Soleimanpoor A, Montazeri G, Rahmani-Jouybari M. Investigating the 5-Years Trend of Poisoning Led to Death in Isfahan Province, Iran, during 2010-2014. *J Isfahan Med School*. 2015; 33(354):1718-1729.
- 17- Mohammadinia A, Jalilian J, Shayeste Y. Characteristics of Patients Hospitalized with drug and substance abuse in Gorgan, Iran, 2008 - 2015. *Iranian Journal of Emergency Care*. 2017; 1(1) :69-76.
- 18- Jabalameli M, Ezadi N. Frequency distribution of opiate poisoning according to individual characteristics and clinical manifestations. *Armaghane Danesh*. 2005; 10(37): 71-80.